

## **EHRlichIOSE: HUMANE MONOCYTOTROPE EHRlichIOSE (HME)**

### **• Klinische aspecten en commentaren**

- Zoönose.
  - Reservoir: herten, honden, .... (*Ehrlichia chaffeensis*, *Ehrlichia ewingii*, ...).
  - Transmissie: teken (*Amblyomma americanum*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes* spp., ...).
- Diagnose van HME is gebaseerd op anamnese (buitenhuisactiviteiten in endemische regio's) en klinische factoren [koorts, rash (35 tot 40% van de patiënten), leuko- en trombocytopenie].
- Belgisch Nationaal referentiecentrum: Militair Hospitaal Koningin Astrid, Brussel (geassocieerd laboratorium: ITG, Antwerpen).

### **• Betrokken pathogenen**

- *Ehrlichia chaffeensis*.

### **• Empirische anti-infectieuze behandeling**

- Geen (gedocumenteerde behandeling).

### **• Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling**

- Regime en standaard posologie: doxycycline (200 mg po q24h of 100 mg po q12h).
- Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: 7 tot 14 dagen.